

第一包采购清单

| 序号 | 药品名称 | 单位 | 限价/元 | 型号或参数 | 执行标准 |
|----|-------|----|------|------------------------|------------------------|
| 1 | 阿胶 | kg | 1954 | 色乌黑，光亮，透明，五腥臭气 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 2 | 巴戟天 | kg | 138 | 条大、肥壮、肉厚色紫 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 3 | 白花蛇舌草 | kg | 50 | 切制 1--1.5cm 长段 | 《甘肃省中药炮制规范》2022年 |
| 4 | 白头翁 | kg | 311 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 5 | 白薇 | kg | 70 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 6 | 柏子仁 | kg | 213 | 无虫蛀，霉变，走油，变质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 7 | 蚕沙 | kg | 25 | 无杂质 | 《卫生部颁药品标准中药材第一册》（1992年 |
| 8 | 草豆蔻 | kg | 109 | 杂质不过 3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 9 | 侧柏炭 | kg | 15 | 无硬核及杂质，0.3cm 筛 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 10 | 蝉蜕 | kg | 1700 | 水洗，杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 11 | 炒赤芍 | kg | 98 | 切2--4mm厚片，0.4cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 12 | 炒鸡内金 | kg | 28 | 无泥沙，杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 13 | 炒酸枣仁 | kg | 930 | 表面微鼓起，微具焦斑。略有焦香气，无残留果核 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 14 | 车前草 | kg | 24 | 无杂质，切断，干燥 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 15 | 沉香 | kg | 1850 | 除去不含树脂的白木，劈成小块 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 16 | 陈皮 | kg | 25 | 切制2--3mm丝，色红，一年以上陈货 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|---------|----|-----|------------------------------|---------------------|
| 17 | 川木通 | kg | 27 | 2--4mm厚片, 0.6cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 18 | 醋艾碳(艾叶) | kg | 28 | 叶多梗少, 杂质不超3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 19 | 醋北柴胡 | kg | 246 | 无芦头, 切制0.2--0.4cm厚片, 过0.3cm筛 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 20 | 醋五灵脂 | kg | 279 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 21 | 大青叶 | kg | 24 | 过0.3cm筛, 叶绿, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 22 | 地丁 | kg | 45 | 1--2cm段, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 23 | 地肤子 | kg | 36 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 24 | 冬凌草 | kg | 50 | 切断, 干燥 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 25 | 豆蔻 | kg | 120 | 杂质不过3%, 气芳香 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 26 | 独活 | kg | 53 | 2--4mm厚片, 过0.4筛, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 27 | 煅牡蛎 | kg | 9 | 水洗, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 28 | 煅珍珠母 | kg | 9 | 除去杂质, 打碎 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 29 | 法半夏 | kg | 160 | 2--4mm厚片, 0.4cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 30 | 蕃泻叶 | kg | 23 | 杂质不过3%, 0.3cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 31 | 防己 | kg | 450 | 2--4mm厚片, 过0.6筛以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 32 | 佛手 | kg | 85 | 2--4mm丝, 无霉变, 3cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 33 | 麸炒白术 | kg | 180 | 2--4mm厚片, 片形0.8cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|--|---------------------|
| 34 | 麸炒枳实 | kg | 48 | 直径1.2-1.6cm | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 35 | 覆盆子 | kg | 287 | 呈圆锥形或扁圆锥形，高0.6~1.3cm，直径0.5~1.2cm | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 36 | 甘草片 | kg | 45 | 直径 0.3~ 3.5cm | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 37 | 狗脊 | kg | 50 | 本品形如狗脊片，表面略鼓起。棕褐色。气微，味淡、微涩。 | 中国药典2020年版 |
| 38 | 海石 | kg | 17 | 本品呈不规则粒状，大小不一。绿色，半透明至透明。质较脆，易打碎。断面浅绿色，似玻璃样。 | 《卫生部颁药品标准》 |
| 39 | 合欢花 | kg | 400 | 本品皱缩成团。总花梗长3~4cm，有时与花序脱离，黄绿色，有纵纹，被稀疏毛茸。花全体密被毛茸，细长而弯曲，长0.7~1cm，淡黄色或黄褐色，无花梗或几无花梗。花萼筒状，先端有5小齿；花冠筒长约为萼筒的2倍，先端5裂，裂片披针形；雄蕊多数，花丝细长，黄棕色至黄褐色，下部合生，上部分离，伸出花冠筒外 | 《中国药典》2020年版一部及四部 |
| 40 | 胡黄连 | kg | 600 | 本品呈不规则的圆形薄片。外表皮灰棕色至暗棕色。切面灰黑色或棕黑色，木部有4~10个类白色点状维管束排列成环，气微， | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|------------|
| 41 | 琥珀 | kg | 160 | 本品呈不规则的块状、颗粒状或多角形。表面黄棕色、血红色及黑褐色，有的具光泽。质硬而脆，断面光亮，有的颜色不一，手捻有涩感。无臭， | 甘肃省中药炮制规范 |
| 42 | 黄连片 | kg | 698 | 本品呈不规则的薄片。外表皮灰黄色或黄褐色，粗糙，有细小的须根。切面或碎断面鲜黄色或红黄色，具放射状纹理，气微，味 | 中国药典2020年版 |
| 43 | 急性子 | kg | 95 | 本品呈椭圆形、扁圆形或卵圆形，长2~3mm，宽1.5~2.5mm。表面棕褐色或灰褐色，粗糙，有稀疏的白色或浅黄棕色小点，种脐位于狭端，稍突出。质坚实，种皮薄，子叶灰白色，半透明，油质 | 中国药典2020年版 |
| 44 | 姜黄 | kg | 35 | 本品呈长圆形或不规则的片状，大小不一，长3~6cm，宽1~3cm，厚0.1~0.4cm。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕。切面黄白色至棕黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点。质脆而坚实。断面灰白色至棕黄色，略粉质。气香特异，味微苦而辛凉。 | 中国药典2020年版 |
| 45 | 降香 | kg | 220 | 本品呈类圆柱形或不规则块状。表面紫红色或红褐色，切面有致密的纹理。质硬，有油性。气微香，味微苦。 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|--|-----------------|
| 46 | 九节菖蒲 | kg | 460 | 本品呈纺锤形，稍弯曲，长1-4cm。表面棕黄色，具多数半环状突起的节，节上有鳞叶痕，斜向交互排列，并有圆形突起的细根痕。质硬而脆，易折断，断面白色或灰白色，有粉性。气 | 《甘肃省炮制规范》2009年版 |
| 47 | 韭菜子 | kg | 70 | 本品呈半圆形或半卵圆形，略扁，长2~4mm，宽1.5~3mm。表面黑色，一面突起，粗糙，有细密的网状皱纹，另一面微凹，皱纹不甚明显。顶端钝，基部稍尖，有点状突起的种脐。质硬。气特异，味微辛 | 中国药典2020年版 |
| 48 | 酒芋肉 | kg | 100 | 山萸肉呈不规则片状或囊状，长1-1.5cm，宽0.5-1cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸，涩，微苦。以肉厚、柔软、色紫红者为佳。酒萸肉形如山萸萸，表面紫黑色或黑色，质滋润柔软。微有酒香气。 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|------|---|------------|
| 49 | 决明子 | kg | 24 | <p>决明 略呈菱形或短圆柱形，两端平行倾斜，长3~7mm，宽2~4mm。表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽。一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有1条突起的棱线，棱线两侧各有1条斜向对称而色较浅的线形凹纹。质坚硬，不易破碎。种皮薄，子叶2，黄色，呈“S”形折曲并重叠。气微，味微苦。</p> <p>小决明 呈短圆柱形，较小，长3~5mm，宽2~3mm。表</p> | 中国药典2020年版 |
| 50 | 龙胆 | kg | 248 | <p>本品呈不规则形的段。根茎呈不规则块片，表面暗灰棕色或深棕色。根圆柱形，表面淡黄色至黄棕色，有的有横皱纹，具纵皱纹。切面皮部黄白色至棕黄色，木部色较浅。气微，味甚</p> | 中国药典2020年版 |
| 51 | 鹿角胶 | kg | 1882 | <p>本品呈扁方形块或丁状。黄棕色或红棕色，半透明，有的上部有黄白色泡沫层。质脆，易碎，断面光亮。气</p> | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|--------|----|-----|---|------------|
| 52 | 罗汉果(个) | 个 | 3.5 | 本品呈卵形、椭圆形或球形，长4.5~8.5cm，直径3.5~6cm。表面褐色、黄褐色或绿褐色，有深色斑块和黄色柔毛，有的具6~11条纵纹。顶端有花柱残痕，基部有果梗痕。体轻，质脆，果皮薄，易破。果瓢（中、内果皮）海绵状，浅棕色。种子扁圆形，多数，长约1.5cm，宽约1.2cm；浅红色至棕红色，两面中间微凹陷，四周有放射状沟纹，边缘有槽。气微，味甜。 | 中国药典2020年版 |
| 53 | 马鞭草 | kg | 26 | 本品呈不规则的段。茎方柱形，四面有纵沟，表面绿褐色，粗糙。切面有髓或中空。叶多破碎，绿褐色，完整者展平后叶片3深裂，边缘有锯齿。穗状花序，有小花多数。气微，味苦。 | 中国药典2020年版 |
| 54 | 密款冬花 | kg | 280 | 本品呈长圆棒状。单生或2~3个基部连生，长1~2.5cm，直径0.5~1cm。上端较粗，下端渐细或带有短梗，外面被有多数鱼鳞状苞片。苞片外表面紫红色或淡红色，内表面密被白色絮状茸毛。体轻，撕开后可见白色茸毛。表面棕黄色或棕褐色，稍带黏性。具蜜香气，味微甜。 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|------------|
| 55 | 蜜白前 | kg | 150 | 根茎呈细圆柱形的段，直径1.5~4mm。表面深黄色至黄棕色，节明显。断面中空。有时节处簇生纤细的根或根痕。略有黏性，味 | 中国药典2020年版 |
| 56 | 蜜百合 | kg | 130 | 本品呈长椭圆形，长2~5cm，宽1~2cm，中部厚1.3~4mm。表面棕黄色，偶见焦斑，略带黏性，味甜。 | 中国药典2020年版 |
| 57 | 墨旱莲 | kg | 27 | 本品呈不规则的段。茎圆柱形，表面绿褐色或墨绿色，具纵棱，有白毛，切面中空或有白色髓。叶多皱缩或破碎，墨绿色，密生白毛，展平后，可见边缘全缘或具浅锯齿。头状花序。 | 中国药典2020年版 |
| 58 | 平贝母 | kg | 200 | 本品呈扁球形，高0.5~1cm，直径0.6~2cm。表面黄白色至浅棕色，外层鳞叶2瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合，顶端略平或微凹入，常稍开裂；中央鳞片小。质坚实而脆，断面 | 中国药典2020年版 |
| 59 | 前胡 | kg | 442 | 本品呈类圆形或不规则形的薄片。表面黄褐色，略具光泽，滋润，有时可见残留的纤维状叶鞘残基。切面黄白色至淡黄色，皮部散有多数棕黄色油点，可见一棕色环纹及放射状纹理，味微甜。 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|----|----|-----|---|------------|
| 60 | 羌活 | kg | 260 | 本品呈类圆形、不规则形横切或斜切片，表皮棕褐色至黑褐色，切面外侧棕褐色，木部黄白色，有的可见放射状纹理。体轻，质脆。气香，味微苦而辛。 | 中国药典2020年版 |
| 61 | 秦皮 | kg | 23 | 本品呈类圆形的厚片。外表皮黄棕色、灰黄色或棕褐色，粗糙，有扭曲纵纹或网状孔纹。切面皮部黄色或棕黄色，木部黄色，有的中心呈枯朽状。气特异，味苦、 | 中国药典2020年版 |
| 62 | 青蒿 | kg | 14 | 本品呈不规则的段，长0.5~1.5cm。茎呈圆柱形，表面黄绿色或棕黄色，具纵棱线，质略硬，切面黄白色，髓白色。叶片多皱缩或破碎，暗绿色或棕绿色，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片及小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短 | 中国药典2020年版 |
| 63 | 青皮 | kg | 26 | 本品呈类圆形厚片或不规则丝状。表面灰绿色或黑绿色，密生多数油室，切面黄白色或淡黄棕色，有时可见瓢囊8~10瓣，淡棕色。气香，味苦 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|----|----|------|--|--------------|
| 64 | 全蝎 | kg | 2860 | 本品头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约6cm。头胸部呈绿褐色，前面有1对短小的螯肢和1对较长大的钳状脚须，形似蟹螯，背面覆有梯形背甲，腹面有足4对，均为7节，末端各具2爪钩；前腹部由7节组成，第7节色深，背甲上有5条隆脊线。背面绿褐色，后腹部棕黄色，6节，节上均有纵沟，末节有锐钩状毒刺，毒刺下方 | 中国药典2020年版一部 |
| 65 | 拳参 | kg | 176 | 本品呈类圆形或近肾形的薄片。外表皮紫褐色或紫黑色。切面棕红色或浅棕红色，平坦，近边缘有一圈黄白色小点（维管束），气微，味苦、涩。 | 中国药典2020年版一部 |
| 66 | 人参 | kg | 690 | 主根呈纺锤形、圆柱形或扁方柱形，长3~10cm，直径1~2cm。表面半透明，红棕色，偶有不透明的暗黄褐色斑块，具纵沟、皱纹及细根痕；上部有时具断续的不明显环纹；下部有2~3条扭曲交叉的支根，并带弯曲的须根或仅具须根残迹。根茎（芦头）长1~2cm，上有数个凹窝状茎痕（芦碗），有的带有1~2条完整或折断的不定根（芦）。质硬而脆，断面平坦，角质样。气微香而 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|------|---|--------------|
| 67 | 桑螵蛸 | kg | 1250 | <p>团螵蛸 略呈圆柱形或半圆形，由多层膜状薄片叠成，长2.5~4cm，宽2~3cm。表面浅黄褐色，上面带状隆起不明显，底面平坦或有凹沟。体轻，质松而韧，横断面可见外层为海绵状，内层为许多放射状排列的小室，室内各有一细小椭圆形卵，深棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。</p> <p>长螵蛸 略呈长条形，一端较细，长2.5~5cm，宽1~1.5cm。表面灰黄色，上面带状隆起明显，带的两侧各有一条暗棕色浅沟和斜向纹理。质硬而脆。</p> <p>黑螵蛸 略呈平行四边形，长2~4cm，宽1.5~2cm。表面灰褐色，上面带状隆起明显，两</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 68 | 山豆根 | kg | 350 | 本品呈不规则的类圆形厚片。外表皮棕色至棕褐色。切面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。 | 中国药典2020年版一部 |
| 69 | 射干 | kg | 95 | 本品呈不规则形或长条形的薄片。外表皮黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，可见残留的须根和须根痕，有的可见环纹。切面淡黄色或鲜黄色，具散在筋脉小点或筋脉纹，有的可见环 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-------|----|------|--|--------------|
| 70 | 伸筋草 | kg | 25.5 | 本品呈不规则的段，茎呈圆柱形，略弯曲。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，线形或针形，黄绿色至淡黄棕色，先端芒状，全缘。切面皮部浅黄色，木部类 | 中国药典2020年版一部 |
| 71 | 生地 | kg | 35 | 本品呈类圆形或不规则的厚片。外表皮棕黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横曲纹。切面棕黄色至黑色或乌黑色，有光泽，具黏性。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 72 | 生石膏 | kg | 12 | 石膏为纤维状的集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。体重，质软，纵断面具绢丝样光泽。气微，味淡。生石膏打碎，除去杂石，粉碎成 | 中国药典2020年版一部 |
| 73 | 十大功劳叶 | kg | 80 | 狭叶番泻 呈长卵形或卵状披针形，长1.5~5cm，宽0.4~2cm，叶端急尖，叶基稍不对称，全缘。上表面黄绿色，下表面浅黄绿色，无毛或近无毛，叶脉稍隆起。革质。气微弱而特异，味微苦，稍有黏性。尖叶番泻 呈披针形或长卵形，略卷曲，叶端短尖或微突， | 中国药典2020年版一部 |
| 74 | 石决明 | kg | 14 | 本品为不规则的碎块。灰白色，有珍珠样彩色光泽。质坚硬。气微，味微 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|---|--------------|
| 75 | 石榴皮碳 | kg | 30 | 本品呈不规则的长条状或不规则的块状。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，有少数疣状突起，有时可见筒状宿萼及果梗痕。内表面黄色或红棕色，有种子脱落后的小凹坑及隔瓢残迹。切面黄色或鲜黄色，略 | 中国药典2020年版一部 |
| 76 | 石韦 | kg | 45 | 本品呈丝条状。上表面黄绿色或灰褐色，下表面密生红棕色星状毛。孢子囊群着生侧脉间或下表面布满孢子囊群。叶全缘。叶片革质。气微，味微 | 中国药典2020年版一部 |
| 77 | 使君子 | kg | 66 | 杂质含量不超过2% | 中国药典2020年版一部 |
| 78 | 首乌藤 | kg | 35 | 本品呈圆柱形的段。外表面紫红色或紫褐色。切面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，导管孔明显，髓部疏松，类白色。气 | 中国药典2020年版一部 |
| 79 | 熟地黄 | kg | 36 | 本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。气微，味甜。 | 中国药典2020年版一部 |
| 80 | 水牛角 | kg | 105 | 本品呈稍扁平而弯曲的锥形，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。上部渐尖，有纵纹，基部略呈三角形，中空。角质，坚硬。气 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-------|----|-----|---|--------------|
| 81 | 铁丝威灵仙 | kg | 138 | 本品呈不规则的段。表面黑褐色、棕褐色或棕黑色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部。切面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形或近圆形，皮部与木部间 | 中国药典2020年版一部 |
| 82 | 葶苈子 | kg | 27 | 本品形如葶苈子，微鼓起，表面棕黄色。有油香气，不带黏性。 | 中国药典2020年版一部 |
| 83 | 通大海 | kg | 450 | 本品呈纺锤形或椭圆形，长2~3cm，直径1~1.5cm。先端钝圆，基部略尖而歪，具浅色的圆形种脐。表面棕色或暗棕色，微有光泽，具不规则的干缩皱纹。外层种皮极薄，质脆，易脱落。中层种皮较厚，黑褐色，质松易碎，遇水膨胀成海绵状。断面可见散在的树脂状小点。内层种皮可与中层种皮剥离，稍革质，内有2片肥厚胚乳，广卵形；子叶2枚，菲薄，紧贴于胚乳内侧，与胚乳等大。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|--------------|
| 84 | 土鳖虫 | kg | 150 | <p>地鳖 呈扁平卵形，长1.3~3cm，宽1.2~2.4cm。前端较窄，后端较宽，背部紫褐色，具光泽，无翅。前胸背板较发达，盖住头部；腹背板9节，呈覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，有丝状触角1对，常脱落，胸部有足3对，具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆，易碎。气腥臭，味微咸。冀地鳖 长2.2~3.7cm，宽1.4~2.5cm。背部黑棕色，通常在边缘带有淡黄褐色斑块及</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 85 | 乌梅炭 | kg | 45 | <p>本品呈类球形或扁球形，直径1.5~3cm。表面乌黑色或棕黑色，皱缩不平，基部有圆形果梗痕。果核坚硬，椭圆形，棕黄色，表面有凹点；种子扁卵形，淡黄色。</p> | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|--------------|
| 86 | 蜈蚣 | 条 | 4.4 | <p>本品呈扁平长条形，长9~15cm，宽0.5~1cm。由头部和躯干部组成，全体共22个环节。头部暗红色或红褐色，略有光泽，有头板覆盖，头板近圆形，前端稍突出，两侧贴有颞肢一对，前端两侧有触角一对。躯干部第一背板与头板同色，其余20个背板为棕绿色或墨绿色，具光泽，自第四背板至第二十背板上常有两条纵沟线；腹部淡黄色或棕黄色，皱缩；自第二节起，每节两侧有步足一对；步足黄色或红褐色，偶有黄白色，呈弯钩形，最末一对步足尾状，故又称尾足，易脱落。质脆，断面有裂隙。气微腥，有特殊刺鼻的臭气，味辛、</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 87 | 西洋参 | kg | 890 | <p>本品呈长圆形或类圆形薄片。外表皮浅黄褐色。切面淡黄白至黄白色，形成层环棕黄色，皮部有黄棕色点状树脂道，近形成层环处较多而明显，木部略呈放射状纹理。气微而特异，味</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 88 | 小通草 | kg | 455 | <p>本品呈圆柱形段，表面白色或淡黄色，无纹理。体轻，质松软，捏之能变形，有弹性，易折断，断面平坦，无空心，显银白色光泽。水浸后有黏滑感。气微，</p> | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|---|--------------|
| 89 | 血余炭 | kg | 80 | 黑色或黑褐色块状或粉末状，质轻脆，断面多孔。 | 中国药典2020年版一部 |
| 90 | 盐黄柏 | kg | 150 | 本品形如黄柏丝，表面深黄色，偶有焦斑。味极苦，微 | 中国药典2020年版一部 |
| 91 | 药艾条 | 条 | 3 | 3-5年陈艾叶制成，占比70-90%（依据等级不同）。 | 中国药典2020年版一部 |
| 92 | 郁金 | kg | 44 | 断面黄白色，疏松有裂隙，味甘。 | 中国药典2020年版一部 |
| 93 | 浙贝母 | kg | 149 | 浙贝母 为类圆形的厚片或碎块，有的具心芽。外皮黄褐色或灰褐色，略皱缩；或淡黄白色，较光滑或被有白色粉末。切面微鼓起或平坦，灰白色或粉白色，略角质状或富粉性。多质坚硬，易折断；或质硬，断面灰白色或白色，有的浅黄棕 | 中国药典2020年版一部 |
| 94 | 制白附子 | kg | 140 | 本品为类圆形或椭圆形厚片，外表皮淡棕色，切面黄色，角质。味淡，微有麻舌感。 | 中国药典2020年版一部 |
| 95 | 制吴茱萸 | kg | 90 | 本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径2~ 5mm。表面暗黄绿色至褐色，粗糙，有多数点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙，基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆，横切面可见子房5室，每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 96 | 炙淫羊藿 | kg | 290 | 本品呈丝片状。上表面绿色、黄绿色或浅黄色，下表面灰绿色，网脉明显，中脉及细脉凸出，边缘具黄色刺毛状细锯齿。近革质。表面浅黄色显油亮光泽。微有羊 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|-------------|-----|----|------|--|--------------|
| 97 | 朱砂 | kg | 2500 | 本品为粒状或块状集合体，呈颗粒状或块片状。鲜红色或暗红色，条痕红色至褐红色，具光泽。体重，质脆，片状者易破碎，粉末状者有闪烁的光泽。气微，味淡。 | 中国药典2020年版一部 |
| 98 | 紫石英 | kg | 15 | 晶体呈立方体或八面体，颜色多样（紫色、绿色、无色等），药用以紫色为佳。 - 断面玻璃光泽，透明至半透明，硬度4（莫氏硬度）。 | 中国药典2020年版一部 |
| 99 | 紫苏叶 | kg | 60 | 本品呈不规则的段或未切叶。叶多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形。边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛。叶柄紫色或紫绿色。带嫩枝者，枝的直径2~5mm，紫绿色，切面中部有 | 中国药典2020年版一部 |
| 合计：27969.4元 | | | | | |

第二包采购清单

| 序号 | 药品名称 | 单位 | 限价/元 | 型号或参数 | 执行标准 |
|----|------|----|------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 白矾 | kg | 14 | 无色透明、无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 2 | 白果仁 | kg | 25 | 个大、均匀、种仁肥厚饱满 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 3 | 白芨 | kg | 360 | 切制 0.2cm 厚片, 0.3cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 4 | 扁蓄 | kg | 20 | 切制 1—1.5cm 段, 表面灰绿色或棕红色, 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 5 | 冰片 | kg | 578 | 国药准字 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 6 | 炒川楝子 | kg | 17 | 厚片, 表面焦黄色 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 7 | 炒蒺藜 | kg | 68 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 8 | 炒芥子 | kg | 45 | 表面淡黄色至深黄色, 有香辣气, 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 9 | 炒苦杏仁 | kg | 88 | 表面黄色至棕黄色, 微带焦斑。有香气 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 10 | 炒莱菔子 | kg | 28 | 表面微鼓起, 色泽加深, 质酥脆, 气微香 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 11 | 炒牛蒡籽 | kg | 62 | 色泽加深, 略鼓起。微有香气, 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 12 | 炒紫苏子 | kg | 39 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 13 | 赤小豆 | kg | 25 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 14 | 醋鳖甲 | kg | 221 | 无残留皮肉, 表面淡黄色, 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 15 | 大腹皮 | kg | 20 | 软腹皮, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-------|----|------|--------------------------|------------------------|
| 16 | 大黄 | kg | 46 | 直径3~10cm | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 17 | 大蓟 | kg | 45 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 18 | 胆南星 | kg | 50 | 呈方块状，棕黄色、灰棕色或棕黑色。质硬 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 19 | 地龙 | kg | 420 | 无泥沙，1.0--1.5cm段，杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 20 | 煅磁石 | kg | 13 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 21 | 煅瓦楞子 | kg | 8 | 洗净，干燥，碾碎 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 22 | 煅赭石 | kg | 10 | 醋淬，碾成粗粉 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 23 | 麸炒六神曲 | kg | 15.5 | 杂质不过 3% | 《甘肃省中药炮制规范》2022年 |
| 24 | 麸炒山药 | kg | 45 | 1.2--1.5cm 均匀圆片，1.0cm 以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 25 | 麸炒枳壳 | kg | 45 | 2--4mm厚片，过0.3号筛，无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 26 | 茯苓皮 | kg | 15 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 27 | 浮萍 | kg | 28 | 杂质不过 3%，0.3cm筛 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 28 | 浮小麦 | kg | 21 | 杂质不过 3%，0.3cm 筛 | 《卫生部颁药品标准中药材第一册》（1992年 |
| 29 | 甘松 | kg | 224 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 30 | 干益母草 | kg | 14 | 1--2cm 段，杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|------------|
| 31 | 枸杞 | kg | 80 | 本品呈类纺锤形或椭圆形，长6~20mm，直径3~10mm。表面红色或暗红色，顶端有小突起状的花柱痕，基部有白色的果梗痕。果皮柔韧，皱缩；果肉肉质，柔润。种子20~50粒，类肾形，扁而翘，长1.5~1.9mm，宽1~1.7mm，表面浅黄色或棕黄色。气微， | 中国药典2020年版 |
| 32 | 谷精草 | kg | 160 | 本品头状花序呈半球形，直径4~5mm。底部有苞片层层紧密排列，苞片淡黄绿色，有光泽，上部边缘密生白色短毛；花序顶部灰白色。揉碎花序，可见多数黑色花药和细小黄绿色未成熟的果实。花茎纤细，长短不一，直径不及1mm，淡黄绿色，有数条扭曲的棱线。质柔软。气 | 中国药典2020年版 |
| 33 | 瓜蒌 | kg | 54 | 本品呈不规则的丝或块状。外表面橙红色或橙黄色，皱缩或较光滑；内表面黄白色，有红黄色丝络，果瓢橙黄色，与多数种子粘结成团。具焦糖 | 中国药典2020年版 |
| 34 | 瓜蒌皮 | kg | 33 | 本品粉末淡黄棕色或黄棕色。石细胞较多，数个成群或单个散在，黄绿色或淡黄色，类方形、圆多角形，孔沟细密而明显。果皮表皮细胞，表面观类方形或类多角形，垂周壁厚薄不一；气孔不定式或近环式，副卫细胞4 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|---|------------------------------------|
| 35 | 贯仲 | kg | 80 | <p>本品呈长倒卵形，略弯曲，上端钝圆或截形，下端较尖，有的纵剖为两半，长7~20cm，直径4~8cm。表面黄棕色至黑褐色，密被排列整齐的叶柄残基及鳞片，并有弯曲的须根。叶柄残基呈扁圆形，长3~5cm，直径0.5~1.0cm；表面有纵棱线，质硬而脆，断面略平坦，棕色，有黄白色维管束5~13个，环列；每个叶柄残基的外侧常有3条须根，鳞片条状披针形，全缘，常脱落。质坚硬，断面略平坦，深绿色至棕色，有黄白色维管束5~13个，环列，其外散有较多的叶迹维管束。</p> | <p>《中国药典》 2020年版一部及 四部</p> |
| 36 | 广藿香 | kg | 30 | <p>本品呈不规则的段。茎略呈方柱形，表面灰褐色、灰黄色或带红棕色，被柔毛。切面有白色髓。叶破碎或皱缩成团，完整者展平后呈卵形或椭圆形，两面均被灰白色绒毛；基部楔形或钝圆，边缘具大小不规则的钝齿；叶柄细，被柔毛。</p> | <p>中国药典2020年 版</p> |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|---|------------|
| 37 | 广金钱草 | kg | 30 | 本品茎呈圆柱形，长可达1m；密被黄色伸展的短柔毛；质稍脆，断面中部有髓。叶互生，小叶1或3，圆形或矩圆形，直径2~4cm；先端微凹，基部心形或钝圆，全缘；上表面黄绿色或灰绿色，无毛，下表面具灰白色紧贴的绒毛，侧脉羽状；叶柄长1~2cm，托叶1对，披针形，长约0.8cm。 | 中国药典2020年版 |
| 38 | 龟板 | kg | 207 | 本品背甲及腹甲由甲桥相连，背甲稍长于腹甲，与腹甲常分离。背甲呈长椭圆形拱状，长7.5~22cm，宽6~18cm；外表面棕褐色或黑褐色，脊棱3条；颈盾1块，前窄后宽；椎盾5块，第1椎盾长大于宽或近相等，第2~4椎盾宽大于长；肋盾两侧对称，各4块；缘盾每侧11块；臀盾2块。腹甲呈板片状，近长方椭圆形，长6.4~21cm，宽5.5~17cm；外表面淡黄棕色至棕黑色，盾片12块，每块常具紫褐色放射状纹理，腹盾、胸盾和股盾中缝均长，喉盾、肛盾次之，肱盾中缝最短；内表面黄白色至灰白色，有的略带血迹或残肉，除净后可 | 中国药典2020年版 |
| 39 | 海金沙 | kg | 360 | 本品呈粉末状，棕黄色或浅棕黄色。体轻，手捻有光滑感，置手中易由指缝滑落。气微，味 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|------------|
| 40 | 海螵蛸 | kg | 102 | 本品为不规则形或类方形小块，类白色或微黄色，角质缘半透明，尾部较宽平，无骨针。体轻，质松，易折断，断面粉质，显疏松层纹。气微 | 中国药典2020年版 |
| 41 | 海桐皮 | kg | 28 | 本品为丝状。外表面灰白色、灰棕色至黑棕色或相间呈斑状，稍粗糙，并有灰白色圆点状皮孔及细斜皱纹。内面黄白色或棕色，平滑。略有光泽。切面黄白色，纤维性。无臭，味苦。 | 甘肃省中药炮制规范 |
| 42 | 海藻 | kg | 55 | 大叶海藻 为不规则的段，卷曲状，棕褐色至黑褐色，有的被白霜。枝干可见短小的刺状突起；叶缘偶见锯齿。气囊棕褐色至黑褐色，球形或卵圆形，有的有柄。小叶海藻 较小，长15~40cm。分枝互生，无刺状突起。叶条形或细匙形，先端稍膨大，中空。气囊腋生，纺锤形或球形，囊柄较 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|--|-------------------|
| 43 | 菊花 | kg | 88 | <p>亳菊 呈倒圆锥形或圆筒形，有时稍压扁呈扇形，直径1.5~3cm，离散。总苞碟状；总苞片3~4层，卵形或椭圆形，草质，黄绿色或褐绿色，外面被柔毛，边缘膜质。花托半球形，无托片或托毛。舌状花数层，雌性，位于外围，类白色，劲直，上举，纵向折缩，散生金黄色腺点；管状花多数，两性，位于中央，为舌状花所隐藏，黄色，顶端5齿裂。瘦果不发育，无冠毛。体轻，质柔润，干时松脆。气清香，味甘、微苦。</p> <p>滁菊 呈不规则球形或扁球形，直径1.5~2.5cm。舌状花类白色，不规则扭曲，内卷，边缘皱缩，有时可见淡褐色腺点。</p> | 中国药典2020年版 |
| 44 | 苦楝皮 | kg | 25 | <p>本品呈不规则板片状、槽状或半卷筒状，长宽不一，厚2~6mm。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有交织的纵皱纹和点状灰棕色皮孔，除去粗皮者淡黄色；内表面类白色或淡黄色。质韧，不易折断，断面纤维性，呈层片状，易剥离。气</p> | 《中国药典》2020年版一部及四部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|---|------------|
| 45 | 昆布 | kg | 64 | <p>海带 卷曲折叠成团状，或缠结成把。全体呈黑褐色或绿褐色，表面附有白霜。用水浸软则膨胀成扁平长带状，长50~150cm，宽10~40cm，中部较厚，边缘较薄而呈波状。类革质，残存柄部扁圆柱状。气腥，味咸。</p> <p>昆布 卷曲皱缩成不规则团状。全体呈黑色，较薄。用水浸软则膨胀呈扁平的叶状，长宽约为16~26cm，厚约1.6mm；两侧呈羽状深裂，裂片呈长舌状，边缘有小齿或全缘。质柔滑。</p> | 中国药典2020年版 |
| 46 | 莲子 | kg | 49 | <p>本品略呈椭圆形、类球形、类半球形或不规则碎块。表面红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。椭圆形、类球形、类半球形者一端中心呈乳头状突起，棕褐色，多有裂口，其周边略下陷。质硬，种皮薄，不易剥离。子叶黄白色，肥厚，中有</p> | 中国药典2020年版 |
| 47 | 芦巴子 | kg | 22 | <p>胡芦巴略呈斜方形，长3-4mm，宽2-3m。表面淡黄色至淡黄棕色，两侧各具深斜沟1条，相交处有点状种脐。质坚硬。种皮薄，胚乳呈半透明状，具黏性，子叶2淡黄色，胚根弯曲。气香，味微苦。</p> | 中国药典2020年版 |
| 48 | 芦根 | kg | 33 | <p>本品呈扁圆柱形段。表面黄白色，节间有纵皱纹。切面中空，有小孔排列</p> | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|--|------------|
| 49 | 络石藤 | kg | 22 | 本品呈不规则的段。茎圆柱形，表面红褐色，可见点状皮孔。切面黄白色，中空。叶全缘，略反卷；革质。 | 中国药典2020年版 |
| 50 | 芒硝 | kg | 69 | 本品为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。气 | 中国药典2020年版 |
| 51 | 密蒙花 | kg | 65 | 本品多为花蕾密聚的花序小分枝，呈不规则圆锥状，长1.5~3cm。表面灰黄色或棕黄色，密被茸毛。花蕾呈短棒状，上端略大，长0.3~1cm，直径0.1~0.2cm；花萼钟状，先端4齿裂；花冠筒状，与萼等长或稍长，先端4裂，裂片卵形；雄蕊4，着生在花冠管中部。质柔软。气微香，味微苦、辛 | 中国药典2020年版 |
| 52 | 蜜麻黄 | kg | 36 | 本品呈圆柱形的段。表面深黄色，微有光泽，略具黏性，有细纵脊线，节上有细小鳞叶。切面中心显红黄色。有蜜香气，味甜 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|--|------------|
| 53 | 蜜旋覆花 | kg | 95 | 旋覆花呈扁球形或类球形，直径1~2cm。总苞由多数苞片组成，呈覆瓦状排列，苞片披针形或条形，灰黄色，长4~11mm；总苞基部有时残留花梗，苞片及花梗表面被白色茸毛，舌状花1列，黄色，长约1cm，多卷曲，常脱落，先端3齿裂；管状花多数，棕黄色，长约5mm，先端5齿裂；子房顶端有少数白色冠毛，长5~6mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻，易散碎。蜜旋覆花形如旋覆花，深黄色。手捻稍粘 | 中国药典2020年版 |
| 54 | 佩兰 | kg | 26 | 本品呈不规则的段。茎圆柱形，表面黄棕色或黄绿色，有的带紫色，有明显的节和纵棱线。切面髓部白色或中空。叶对生，叶片多皱缩、破碎，绿褐色。气芳香，味 | 中国药典2020年版 |
| 55 | 片姜黄 | kg | 48 | 本品呈长圆形或不规则的片状，大小不一，长3~6cm，宽1~3cm，厚0.1~0.4cm。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕。切面黄白色至棕黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点。质脆而坚实。断面灰白色至棕黄色，略粉质。气香特异，味微苦而辛 | 中国药典2020年版 |
| 56 | 蒲黄 | kg | 140 | 本品为黄色粉末。体轻，放水中则漂浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|--------------|
| 57 | 忍冬藤 | kg | 15 | 本品呈不规则的段。表面棕红色（嫩枝），有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易脱落。切面黄白色，中空。偶有残叶，暗绿色，略有茸毛。气微，老枝味微苦， | 中国药典2020年版一部 |
| 58 | 肉豆蔻 | kg | 155 | 本品形如肉豆蔻，表面为棕褐色，有裂隙。气香，味辛 | 中国药典2020年版一部 |
| 59 | 砂仁 | kg | 360 | 阳春砂、绿壳砂 呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长1.5~2cm，直径1~1.5cm。表面棕褐色，密生刺状突起，顶端有花被残基，基部常有果梗。果皮薄而软。种子集结成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子5~26粒。种子为不规则多面体，直径2~3mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色膜质假种皮；质硬，胚乳灰白色。气芳 | 中国药典2020年版一部 |
| 60 | 蛇床子 | kg | 53 | 本品为双悬果，呈椭圆形，长2~4mm，直径约2mm。表面灰黄色或灰褐色，顶端有2枚向外弯曲的柱基，基部偶有细梗。分果的背面有薄而突起的纵棱5条，接合面平坦，有2条棕色略突起的纵棱线。果皮松脆，揉搓易脱落。种子细小，灰棕色，显油性。气 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|--------------|
| 61 | 升麻 | kg | 145 | 本品为不规则的厚片，厚2~4mm。外表面黑褐色或棕褐色，粗糙不平，有的可见须根痕或坚硬的细须根残留，切面黄绿色或淡黄白色，具有网状或放射状纹理。体轻，质硬，纤维性。气微，味微苦而 | 中国药典2020年版一部 |
| 62 | 石菖蒲 | kg | 148 | 本品呈扁圆形或长条形的厚片。外表皮棕褐色或灰棕色，有的可见环节及根痕。切面纤维性，类白色或微红色，有明显环纹及油点。气芳香，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 63 | 丝瓜络 | kg | 125 | 本品为丝状维管束交织而成，多呈长棱形或长圆筒形，略弯曲，长30~70cm，直径7~10cm。表面黄白色。体轻，质韧，有弹性，不能折断。横切面可见子房3室，呈空洞状。气微， | 中国药典2020年版一部 |
| 64 | 锁阳 | kg | 190 | 本品为不规则形或类圆形的片。外表皮棕色或棕褐色，粗糙，具明显纵沟及不规则凹陷。切面浅棕色或棕褐色，散在黄色三角状维管束。气微， | 中国药典2020年版一部 |
| 65 | 天冬 | kg | 110 | 本品呈类圆形或不规则形的片。外表面黄白色至淡黄棕色，半透明，光滑或具深浅不等的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性。切面角质样，中柱黄白色。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|------|--|--------------|
| 66 | 天麻 | kg | 292 | 本品呈不规则的薄片。外表皮淡黄色至黄棕色，有时可见点状排成的横环纹。切面黄白色至淡棕色。角质样，半透明。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 67 | 土茯苓 | kg | 70 | 本品呈长圆形或不规则的薄片，边缘不整齐。切面黄白色或红棕色，粉性，可见点状维管束及多数小亮点；以水湿润后有黏滑感。气微，味微甘 | 中国药典2020年版一部 |
| 68 | 菟丝子 | kg | 60 | 菟丝子呈类球形，直径1~2mm。表面灰棕色至棕褐色，粗糙，种脐线形或扁圆形。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡。盐菟丝子表面棕黄色，裂开，略有香气。 | 中国药典2020年版一部 |
| 69 | 王不留行 | kg | 34.5 | 本品呈类球形爆花状，表面白色，质松脆。 | 中国药典2020年版一部 |
| 70 | 五倍子 | kg | 93 | 本品呈不规则碎片状。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛，内壁光滑。质硬而脆，断面角质样，有光泽。气特 | 中国药典2020年版一部 |
| 71 | 细辛 | kg | 760 | 本品呈不规则的段。根茎呈不规则圆形，外表皮灰棕色，有时可见环形的节。根细，表面灰黄色，平滑或具纵皱纹。切面黄白色或白色。气辛 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|---|--------------|
| 72 | 香薷 | kg | 27 | 本品呈不规则的段，基部紫红色，上部黄绿色或淡黄色，全体密被白色茸毛。茎方柱形，基部类圆形，直径1~2mm，节明显，节间长4~7cm；质脆，易折断。叶对生，多皱缩或脱落，叶片展平后呈长卵形或披针形，暗绿色或黄绿色，边缘有3~5疏浅锯齿。穗状花序顶生及腋生，苞片圆卵形或圆倒卵形，脱落或残存；花萼宿存，钟状，淡紫红色或灰绿色，先端5裂，密被茸毛。小坚果4，直径0.7~1.1mm，近圆球形， | 中国药典2020年版一部 |
| 73 | 小蓟炭 | kg | 21 | 本品呈不规则的段。茎呈圆柱形，表面灰绿色或带紫色，具纵棱和白色柔毛。切面中空。叶片多皱缩或破碎，叶齿尖具针刺；两面均具白色柔毛。头状花序，总苞钟状；花紫红 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|---|--------------|
| 74 | 辛夷 | kg | 235 | 本品呈长卵形，似毛笔头，长1.2~2.5cm，直径0.8~1.5cm。基部常具短梗，长约5mm，梗上有类白色点状皮孔。苞片2~3层，每层2片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面类棕色，无毛。花被片9，棕色，外轮花被片3，条形，约为内两轮长的1/4，呈萼片状，内两轮花被片6，每轮3，轮状排列。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛 | 中国药典2020年版一部 |
| 75 | 盐补骨脂 | kg | 40 | 本品呈肾形，略扁，长3~5mm，宽2~4mm，厚约1.5mm。表面黑色、黑褐色或灰褐色，具细微网状皱纹。顶端圆钝，有一小突起，凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄，与种子不易分离；种子1枚，子叶2，黄白色，有油性。气香，味辛、微苦 | 中国药典2020年版一部 |
| 76 | 盐车前子 | kg | 88 | 本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约2mm，宽约1mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气 | 中国药典2020年版一部 |
| 77 | 盐沙苑子 | kg | 550 | 本品略呈肾形而稍扁，长2~2.5mm，宽1.5~2mm，厚约1mm。表面鼓起，深褐绿色或深灰褐色。气微，味微咸，嚼之有豆腥味。 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|--|--------------|
| 78 | 盐小茴香 | kg | 35 | <p>小茴香为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长4~8mm，直径1.5~2.5mm。表面黄绿色或淡黄色，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的柱基，基部有时有细小的果梗。分果呈长椭圆形，背面有纵棱5条，接合面平坦而较宽。横切面略呈五边形，背面的四边约等长。有特异香气，味微甜、辛。盐小茴香形如小茴香，微鼓起，色泽</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 79 | 盐知母 | kg | 80 | <p>知母呈不规则类圆形的厚片。外表皮黄棕色或棕色，可见少量残存的黄棕色叶基纤维和凹陷或突起的点状根痕。切面黄白色至黄色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。盐知母形如知母片，色黄或微带</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 80 | 益智仁 | kg | 170 | <p>益智仁为不规则扁圆形的种子或种子团残瓣。种子略有钝棱，直径约3mm；表面灰黄色至灰褐色，具细皱纹；外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，胚乳白色。有特异香气，味辛、微苦。盐益智仁形如益智仁。表面棕褐色至黑褐色，质硬，胚乳白色。有特异香</p> | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|--------------|
| 81 | 茵陈 | kg | 30 | <p>绵茵陈 多卷曲成团状，灰白色或灰绿色，全体密被白色茸毛，绵软如绒。茎细小，长1.5~2.5cm，直径0.1~0.2cm，除去表面白色茸毛后可见明显纵纹；质脆，易折断。叶具柄；展平后叶片呈一至三回羽状分裂，叶片长1~3cm，宽约1cm；小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形，先端锐尖。气清香，味微苦。</p> <p>花茵陈 茎呈圆柱形，多分枝，长30~100cm，直径2~8mm；表面淡紫色或紫色，有纵条纹，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。叶密集，或多脱落；下部叶二至三回羽状深裂，裂片条形或细条形，两面密被白色柔毛；茎生叶一至二回羽状分裂，裂片条形或细条形，先端锐尖。</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 82 | 皂角刺 | kg | 190 | <p>本品为主刺和1~2次分枝的棘刺。主刺长圆锥形，长3~15cm或更长，直径0.3~1cm；分枝刺长1~6cm，刺端锐尖。表面紫棕色或棕褐色。体轻，质坚硬，不易折断。切片厚0.1~0.3cm，常带有尖细的刺端；木部黄白色，髓部疏松，淡红棕色；质脆，易</p> | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-------|----|-----|--|--------------|
| 83 | 泽兰 | kg | 20 | 本品呈不规则的段。茎方柱形，四面均有浅纵沟，表面黄绿色或带紫色，节处紫色明显，有白色茸毛。切面黄白色，中空。叶多破碎，展平后呈披针形或长圆形，边缘有锯齿。有时可见轮伞花序。气 | 中国药典2020年版一部 |
| 84 | 翟麦 | kg | 26 | 本品呈不规则段。茎圆柱形，表面淡绿色或黄绿色，节明显，略膨大。切面中空。叶多破碎。花萼筒状，苞片4~6。蒴果长筒形，与宿萼等长。种子细小，多数。气 | 中国药典2020年版一部 |
| 85 | 珍珠透骨草 | kg | 40 | 本品茎圆柱状，直径0.1-0.5cm；被细茸毛，表面灰绿色，质脆，易折断，切面外侧有紫色环。叶片灰绿色，皱缩，破碎不全，展开后完整者呈披针形、椭圆状披针形，叶上部全缘，下部具缺刻状钝齿，两面被茸毛。花小形，白色。蒴果三棱状扁圆形被疏毛及疣状突，气微，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 86 | 制草乌 | kg | 220 | 本品呈不规则圆形或近三角形的片。表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环和点状维管束，并有空隙，周边皱缩或弯曲。质脆。气微，味微辛辣， | 中国药典2020年版一部 |
| 87 | 制川乌 | kg | 220 | 本品为不规则或长三角形的片。表面黑褐色或黄褐色，有灰棕色形成层环纹。体轻，质脆，断面有光泽。气微，微有麻舌感。 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----------|------|----|-----|--|--------------|
| 88 | 制何首乌 | kg | 70 | 本品呈不规则皱缩状的块片，厚约1cm。表面黑褐色或棕褐色，凹凸不平。质坚硬，断面角质样，棕褐色或黑色。气微，味微甘而 | 中国药典2020年版一部 |
| 89 | 猪苓 | kg | 286 | 本品呈类圆形或不规则的厚片。外表皮黑色或棕黑色，皱缩。切面类白色或黄白色，略呈颗粒状。气微，味淡 | 中国药典2020年版一部 |
| 90 | 竹叶 | kg | 38 | 本品呈不规则的段、片，可见茎碎片、节和开裂的叶鞘。叶碎片浅绿色或黄绿色，有的皱缩卷曲，叶脉平行，具横行小脉，形成长方形的网格状，下表面尤为明显。体轻，质柔韧。气 | 中国药典2020年版一部 |
| 合计：9607元 | | | | | |

第三包采购清单

| 序号 | 药品名称 | 单位 | 限价/元 | 型号或参数 | 执行标准 |
|----|-------|----|------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 白茅根 | kg | 36 | 切制1-1.5cm 长段, 过 0.3cm 筛, 无碎屑 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 2 | 白藓皮 | kg | 410 | 抽心率 98%以上, 4mm 左右厚片 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 3 | 板兰根 | kg | 49 | 切制0.5-1cm长段 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 4 | 北沙参 | kg | 88 | 2--4mm 厚片, 1.0cm 以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 5 | 炒冬瓜子 | kg | 199 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》1977年 |
| 6 | 炒僵蚕 | kg | 342 | 水洗, 炒至表面黄色 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 7 | 充蔚子 | kg | 60 | 杂质不超过1% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 8 | 醋没药 | kg | 126 | 表面光亮, 有醋香气, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 9 | 醋南五味子 | kg | 120 | 杂质不过 3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 10 | 地骨皮 | kg | 188 | 水洗, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 11 | 丁香 | kg | 116 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 12 | 冬瓜皮 | kg | 30 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 13 | 煅龙骨 | kg | 348 | 碎块, 无粉末, 杂质不过 3% | 《甘肃省中药炮制规范》2022年 |
| 14 | 粉葛 | kg | 26 | 除去杂质, 干燥, 切块 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 15 | 蜂房 | kg | 1666 | 无杂质, 灰分达标 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 16 | 蜂蜜 | kg | 78 | 半透明、带光泽、浓稠的液体, 白色至淡黄色或橘黄色至黄褐色 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|------|----|------|---|---------------------|
| 17 | 麸炒苍术 | kg | 106 | 2--4mm 厚片， 0.4cm 以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 18 | 茯神 | kg | 89 | 1.0cm 以上块，带 神 | 《甘肃省中药炮制规范》2022年 |
| 19 | 干姜 | kg | 38 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 20 | 干鱼腥草 | kg | 22.5 | 本品为不规则的段。茎呈扁圆柱形，表面淡红棕色至黄棕色，有纵棱。叶片多破碎，黄棕色至暗棕色。穗状花序黄棕色。搓碎具鱼腥气，味涩。 | 中国药典2020年版 |
| 21 | 钩藤 | kg | 134 | 本品茎枝呈圆柱形或类方柱形，长2~3cm，直径0.2~0.5cm。表面红棕色至紫红色者具细纵纹，光滑无毛；黄绿色至灰褐色者有的可见白色点状皮孔，被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩（不育花序梗），或仅一侧有钩，另一侧为突起的疤痕；钩略扁或稍圆，先端细尖，基部较阔；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性， | 中国药典2020年版 |
| 22 | 汉三七 | kg | 500 | 主根呈类圆锥形或圆柱形，长1~6cm，直径1~4cm。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|------------|
| 23 | 蒿苳 | kg | 233 | 本品呈不规则的厚片。外表皮棕褐色至黑褐色，粗糙。切面黄白色至浅黄褐色，具裂隙或孔洞，纤维性。气浓香，味辛、苦、微 | 中国药典2020年版 |
| 24 | 黑芝麻 | kg | 33 | 本品呈扁卵圆形，长约3mm，宽约2mm。表面黑色，平滑或有网状皱纹。尖端有棕色点状种脐。种皮薄，子叶2，白色，富油性。气微，味甘，有油香 | 中国药典2020年版 |
| 25 | 猴姜 | kg | 95 | 本品呈不规则厚片。表面深棕色至棕褐色，常残留细小棕色的鳞片，有的可见圆形的叶痕。切面红棕色，黄色的维管束点状排列成环。气微，味淡 | 中国药典2020年版 |
| 26 | 厚朴 | kg | 27 | 本品呈弯曲的丝条状或单、双卷筒状。外表面灰褐色，有时可见椭圆形皮孔或纵皱纹。内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕。切面颗粒性，有油性，有的可见小亮星。气香，味 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|---|------------|
| 27 | 槲寄生 | kg | 49 | <p>本品茎枝呈圆柱形，2~5叉状分枝，长约30cm，直径0.3~1cm；表面黄绿色、金黄色或黄棕色，有纵皱纹；节膨大，节上有分枝或枝痕；体轻，质脆，易折断，断面不平坦，皮部黄色，木部色较浅，射线放射状，髓部常偏向一边。叶对生于枝梢，易脱落，无柄；叶片呈长椭圆状披针形，长2~7cm，宽0.5~1.5cm；先端钝圆，基部楔形，全缘；表面黄绿色，有细皱纹，主脉5出，中</p> | 中国药典2020年版 |
| 28 | 滑石 | kg | 9 | <p>本品为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有滑腻感。气微，味淡</p> | 中国药典2020年版 |
| 29 | 槐花 | kg | 38 | <p>皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，黄绿色，先端5浅裂；花瓣5，黄色或黄白色，1片较大，近圆形，先端微凹，其余4片长圆形。雄蕊10，其中9个基部连合，花丝细长。雌蕊圆柱形，弯曲。体轻。气微，味微</p> | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|-------------------|
| 30 | 鸡血藤 | kg | 21 | 本品为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚0.3~1cm。栓皮灰棕色，有的可见灰白色斑，栓皮脱落处显红棕色。质坚硬。切面木部红棕色或棕色，导管孔多数；韧皮部有树脂状分泌物呈红棕色至黑棕色，与木部相间排列呈数个同心性椭圆形环或偏心性半圆形环；髓 | 中国药典2020年版 |
| 31 | 酒黄精 | kg | 145 | 本品呈不规则的厚片。表面棕褐色至黑色，有光泽，中心棕色至浅褐色，可见筋脉小点。质较柔软。味甜，微 | 中国药典2020年版 |
| 32 | 柯子 | kg | 21 | 本品呈全裂或半裂开的扁长梭形、扁长圆形或扁卵圆形、横断裂开的锥形或不规则块状。外表面棕色、黄褐色或暗棕褐色。内表面暗棕色、暗黄褐色或暗棕褐色，粗糙凹凸不平。质坚硬、可碎断。气 | 《中国药典》2020年版一部及四部 |
| 33 | 荔枝核 | kg | 26 | 本品呈长圆形或卵圆形，略扁，长1.5~2.2cm，直径1~1.5cm。表面棕红色或紫棕色，平滑，有光泽，略有凹陷及细波纹，一端有类圆形黄棕色的种脐，直径约7mm。质硬。子叶2，棕黄色。气微，味微甘、 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|------------|
| 34 | 鹿角霜 | kg | 178 | 本品呈长圆柱形或不规则的块状，大小不一。表面灰白色，显粉性，常具纵棱，偶见灰色或灰棕色斑点。体轻，质酥，断面外层较致密，白色或灰白色，内层有蜂窝状小孔，灰褐色或灰黄色。有吸湿性。气微，味淡， | 中国药典2020年版 |
| 35 | 麻黄根 | kg | 42 | 本品呈类圆形的厚片。外表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及支根痕。切面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，纤维性，具放射状纹，有的中心有髓 | 中国药典2020年版 |
| 36 | 马勃 | kg | 699 | 脱皮马勃 呈扁球形或类球形，无不孕基部，直径15~20cm。包被灰棕色至黄褐色，纸质，常破碎呈块片状，或已全部脱落。抱体灰褐色或浅褐色，紧密，有弹性，用手撕之，内有灰褐色棉絮状的丝状物。触之则孢子呈尘土样飞扬，手捻有细腻感。臭似尘土，无味。大马勃 不孕基部小或无。残留的包被由黄棕色的膜状外包被和较厚的灰黄色的内包被所组成，光滑，质硬而脆，成块脱落。抱体浅青褐色，手捻有润滑感。紫色马勃 呈陀螺形，或已压扁呈扁圆形，直径5~12cm，不孕基部发达。包被薄，两层，紫褐色，粗糙，有圆形凹陷， | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|------|----|------|--|------------|
| 37 | 猫爪草 | kg | 1066 | 本品由数个至数十个纺锤形的块根簇生，形似猫爪，长3~10mm，直径2~3mm，顶端有黄褐色残茎或茎痕。表面黄褐色或灰黄色，久存色泽变深，微有纵皱纹，并有点状须根痕和残留须根。质坚实，断面类白色或黄白色，空心或实心，粉性。气微，味微甘。 | 中国药典2020年版 |
| 38 | 蜜枇杷叶 | kg | 19 | 本品呈丝条状。表面黄棕色或红棕色，微显光泽下表面可见绒毛，主脉突出。革质而脆。具，略带黏性。具 | 中国药典2020年版 |
| 39 | 绵萆薢 | kg | 45 | 本品为不规则的斜切片，边缘不整齐，大小不一，厚2~5mm。外皮黄棕色至黄褐色，有稀疏的须根残基，呈圆锥状突起。质疏松，略呈海绵状，切面灰白色至浅灰棕色，黄棕色点状维管束散在。气 | 中国药典2020年版 |
| 40 | 木蝴蝶 | kg | 87 | 本品为蝶形薄片，除基部外三面延长成宽大菲薄的翅，长5~8cm，宽3.5~4.5cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽，上有放射状纹理，边缘多破裂。体轻，剥去种皮，可见一层薄膜状的胚乳紧裹于子叶之外。子叶2，蝶形，黄绿色或黄色，长径1~1.5cm。气微，味微 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|---|------------|
| 41 | 木香 | kg | 68 | 本品呈类圆形或不规则的厚片。外表皮黄棕色至灰褐色，有纵皱纹。切面棕黄色至棕褐色，中部有明显菊花心状的放射纹理，形成层环棕色，褐色油点（油室）散在。气香特 | 中国药典2020年版 |
| 42 | 木贼 | kg | 21 | 本品呈管状的段。表面灰绿色或黄绿色，有18~30条纵棱，棱上有多数细小光亮的疣状突起；节明显，节上着生筒状鳞叶，叶鞘基部和鞘齿黑棕色，中部淡棕黄色。切面中空，周边有多数圆形的小空腔。气微，味甘淡 | 中国药典2020年版 |
| 43 | 藕节 | kg | 35 | 本品形如藕节，表面黑褐色或焦黑色，内部黄褐色或棕褐色。断面可见多数类圆形的孔。气微，味微甘、涩 | 中国药典2020年版 |
| 44 | 炮姜 | kg | 51 | 本品呈不规则膨胀的块状，具指状分枝。表面棕黑色或棕褐色。质轻泡，断面边缘处显棕黑色，中心棕黄色，细颗粒性，维管束散在。气香、特 | 中国药典2020年版 |
| 45 | 千年健 | kg | 58 | 本品呈类圆形或不规则形的片。外表皮黄棕色至红棕色，粗糙，有的可见圆形根痕。切面红褐色，具有众多黄色纤维束，有的呈针刺状。气香， | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|--|--------------|
| 46 | 青风藤 | kg | 22 | 本品呈类圆形的厚片。外表面绿褐色至棕褐色，有的灰褐色，有纵纹，有的可见皮孔。切面灰黄色至淡灰黄色，皮部窄，木部有明显的放射状纹理，其间具有多数小孔，髓部淡黄白色至棕黄色。气 | 中国药典2020年版 |
| 47 | 青箱子 | kg | 85 | 本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径1~1.5mm表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹处有种脐。种皮薄而脆。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 48 | 桑枝 | kg | 10 | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。外表皮灰黄色或黄褐色，有点状皮孔。切面皮部较薄，木部黄白色，射线放射状，髓部白色或黄白色。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|------|---|--------------|
| 49 | 山茨菇 | kg | 3850 | <p>毛慈菇：呈不规则扁球形或圆锥形，顶端渐突起，基部有须根痕。长1.8~3cm，膨大部直径1~2cm。表面黄棕色或棕褐色，有纵皱纹或纵沟，中部有2~3条微突起的环节，节上有鳞片叶干枯腐烂后留下的丝状纤维。质坚硬，难折断，断面灰白色或黄白色，略呈角质。气微，味淡，带黏性。冰球子：呈圆锥形，瓶颈状或不规则团块，直径1~2cm，高1.5~2.5cm。顶端渐尖，尖端断头处呈盘状，基部膨大且圆平，中央凹入，有1~2条环节，多偏向一侧。撞去外皮者表面黄白色，带表皮者浅棕色，光滑，有不</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 50 | 生白芍 | kg | 150 | <p>本品形如白芍片，表面微黄色或淡棕黄色，有的可见焦斑。气微香。</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 51 | 石斛 | kg | 83 | <p>本品呈扁圆柱形或圆柱形的段。表面金黄色、绿黄色或棕黄色，有光泽，有深纵沟或纵棱，有的可见棕褐色的节。切面黄白色至黄褐色，有多数散在的筋脉点。气微，味淡或微苦，</p> | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|--------------|
| 52 | 柿蒂 | kg | 65 | 本品呈扁圆形，直径1.5~2.5cm。中央较厚，微隆起，有果实脱落后圆形疤痕，边缘较薄，4裂，裂片多反卷，易碎；基部有果梗或圆孔状的果梗痕。外表面黄褐色或红棕色，内表面黄棕色，密被细绒毛。质硬而脆。 | 中国药典2020年版一部 |
| 53 | 苏木 | kg | 29 | 本品呈细条状、不规则片状，或为粗粉。片、条表面黄红色至棕红色，常见纵向纹理。质坚硬。有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。气微，味 | 中国药典2020年版一部 |
| 54 | 檀香 | kg | 630 | 本品为长短不一的圆柱形木段，有的略弯曲，一般长约1m，直径10~30cm。外表面灰黄色或黄褐色，光滑细腻，有的具疤节或纵裂，横截面呈棕黄色，显油迹；棕色年轮明显或不明显，纵向劈开纹理顺直。质坚实，不易折断。气清香，燃烧时香气更浓； | 中国药典2020年版一部 |
| 55 | 稀俭草 | kg | 16 | 本品呈不规则的段。茎略呈方柱形，表面灰绿色、黄棕色或紫棕色，有纵沟和细纵纹，被灰色柔毛。切面髓部类白色。叶多破碎，灰绿色，边缘有钝锯齿，两面皆具白色柔毛。有时可见黄色头状花序 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|--------------|
| 56 | 仙茅 | kg | 248 | 本品呈类圆形或不规则形的厚片或段，外表皮棕色至褐色，粗糙，有的可见纵横皱纹和细孔状的须根痕。切面灰白色至棕褐色，有少数棕色小点，中间有深色环纹。气微香，味微 | 中国药典2020年版一部 |
| 57 | 薤白 | kg | 86 | 小根蒜 呈不规则卵圆形，高0.5~1.5cm，直径0.5~1.8cm。表面黄白色或淡黄棕色，皱缩，半透明，有类白色膜质鳞片包被，底部有突起的鳞茎盘。质硬，角质样。有蒜臭，味微辣。 薤 呈略扁的长卵形，高1~3cm，直径0.3~1.2cm。表面淡黄棕色或棕褐色，具浅纵皱纹。质较软，断面可 | 中国药典2020年版一部 |
| 58 | 续断片 | kg | 58 | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。外表皮灰褐色至黄褐色，有纵皱。切面皮部墨绿色或棕褐色，木部灰黄色或黄褐色，可见放射状排列的导管束纹，形成层部位多有深色环。气微， | 中国药典2020年版一部 |
| 59 | 银柴胡 | kg | 251 | 根呈圆柱形，表面淡黄色至灰黄色，有扭曲纵纹及砂眼（凹陷小孔）。 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|-------------|----|----|-----|---|--------------|
| 60 | 紫草 | kg | 558 | <p>新疆紫草：本品为不规则的圆柱形切片或条形片状，直径1~2.5cm。紫红色或紫褐色。皮部深紫色。圆柱形切片，木部较小，黄白色或黄色。内蒙紫草：本品为不规则的圆柱形切片或条形片状，有的可见短硬毛，直径0.5~4cm，质硬而脆。紫红色或紫褐色。皮部深紫色。圆柱形切片，木部较</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 合计：13978.5元 | | | | | |

第四包采购清单

| 序号 | 药品名称 | 单位 | 限价/元 | 型号或参数 | 执行标准 |
|----|------|----|------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 北豆根 | kg | 50 | 厚片干燥杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 2 | 炒白扁豆 | kg | 39 | 无杂质，表面微黄色，有焦斑 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 3 | 炒苍耳子 | kg | 35 | 无梗叶等杂质，炒至微黄色，去刺 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 4 | 炒火麻仁 | kg | 69 | 去杂质及果皮，有香气 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 5 | 炒蔓荆子 | kg | 220 | 杂质不过 3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 6 | 炒栀子 | kg | 98 | 破碎，杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 7 | 赤石脂 | kg | 12 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 8 | 穿山龙 | kg | 35 | 切 2--4mm 厚片，0.4cm 以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 9 | 醋莪术 | kg | 38 | 切 2--4, mm 厚片，0.8cm 以上，有醋香气 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 10 | 醋乳香 | kg | 125 | 表面光亮，有醋香气，杂质不过 3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 11 | 醋三棱 | kg | 45 | 表面微黄色， 2--4, mm 厚片，0.5cm 以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 12 | 醋延胡索 | kg | 240 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 13 | 麸炒芡实 | kg | 70 | 两瓣，杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|------------|
| 14 | 海风藤 | kg | 108 | 本品呈圆柱形，片厚2~4cm，段长10~15cm。表面灰褐色或褐色，粗糙，有纵向棱状纹理及明显的节，节部膨大，上生不定根。体轻，质脆，易折断，皮部窄，木部宽广，灰黄色，导管孔多数，射线灰白色，放射状排列，皮部与木部交界处常有裂隙，中心有灰褐色髓。气 | 中国药典2020年版 |
| 15 | 黑顺片 | kg | 105 | 本品为纵切片，上宽下窄，长1.7~5cm，宽0.9~3cm，厚0.2~0.5cm。外皮黑褐色，切面暗黄色，油润具光泽，半透明状，并有纵向导管束。质硬而脆，断面角质样。气微，味淡。 | 中国药典2020年版 |
| 16 | 红藤 | kg | 35 | 饮片表面应光洁，无污染，无泛油，无枝梗，色泽鲜明，呈现红藤应有的颜色，如红棕色、黄棕色或灰褐色 | 中国药典2020年版 |
| 17 | 虎杖 | kg | 27 | 本品为不规则厚片。外表皮棕褐色，有时可见纵皱纹及须根痕；切面皮部较薄，木部宽广，棕黄色，射线放射状，皮部与木部较易分离；根茎髓中有隔或呈空洞状。质坚硬。气微，味 | 中国药典2020年版 |
| 18 | 酒苁蓉 | kg | 121 | 酒苁蓉形如肉苁蓉片。表面黑棕色，切面点状维管束，排列成波状环纹。质柔润。略有酒香气，味甜，微苦。 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|--|------------|
| 19 | 酒军 | kg | 56 | 本品呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，有的可见类白色网状纹理及星点（异型维管束）散在，残留的外皮棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，无星点。气清香，味苦而微 | 中国药典2020年版 |
| 20 | 苦参 | kg | 44 | 本品呈类圆形或不规则形的厚片。外表皮灰棕色或棕黄色，有时可见横长皮孔样突起，外皮薄，常破裂反卷或脱落，脱落处显黄色或棕黄色，光滑。切面黄白色，纤维性，具放射状纹理和裂隙，有的可见同心性环纹。气 | 中国药典2020年版 |
| 21 | 莲须 | kg | 183 | 本品呈线形。花药扭转，纵裂，长1.2~1.5cm，直径约0.1cm，淡黄色或棕黄色。花丝纤细，稍弯曲，长1.5~1.8cm，淡紫色。气微香，味涩。 | 中国药典2020年版 |
| 22 | 蜜百部 | kg | 80 | 本品呈不规则厚片或不规则条形斜片；表面棕黄色或褐棕色，略带焦斑，有深纵皱纹，质韧软稍有黏性， | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|------|----|-----|---|------------|
| 23 | 蜜金樱子 | kg | 78 | 本品呈倒卵形纵剖瓣。表面红黄色或红棕色，有突起的棕色小点。顶端有花萼残基，下部渐尖。花托壁厚1~2mm，内面淡黄色，残存淡黄色绒毛。气微，味甘、微涩 | 中国药典2020年版 |
| 24 | 蜜桑白皮 | kg | 79 | 本品呈不规则的丝条状。表面深黄色或棕黄色，略具光泽，滋润，纤维性强，易纵向撕裂。气微，味甜。 | 中国药典2020年版 |
| 25 | 蜜玉竹 | kg | 88 | 本品呈不规则厚片。直径5-20mm，厚2-4mm或段长5-10mm。表面棕黄色，嚼之发黏，具蜜香气，味甜。 | 中国药典2020年版 |
| 26 | 蜜远志 | kg | 425 | 根呈圆柱形，略弯曲，长3-15cm，直径0.3-0.8cm。色泽加深，嚼之有刺喉感，味甜，后苦、微辛。 | 中国药典2020年版 |
| 27 | 蜜紫苑 | kg | 90 | 本品呈不规则的厚片或段。表面棕褐色或紫棕色，有纵皱纹。切面淡棕色，中心具棕黄色的木心。有蜜香 | 中国药典2020年版 |
| 28 | 茜草 | kg | 400 | 本品呈不规则的厚片或段，根呈圆柱形，外表皮红棕色或暗棕色，具细纵纹；皮部脱落处呈黄红色。切面皮部狭，紫红色，木部宽广，淡黄红色，导管孔多数。气微，味微苦，久嚼 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|------|---|--------------|
| 29 | 秦艽 | kg | 105 | 本品呈类圆形的厚片。外表皮黄棕色、灰黄色或棕褐色，粗糙，有扭曲纵纹或网状孔纹。切面皮部黄色或棕黄色，木部黄色，有的中心呈枯朽状。气特异，味苦、 | 中国药典2020年版 |
| 30 | 青黛 | kg | 240 | 本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块、颗粒，用手搓捻即成细末。微有草腥 | 中国药典2020年版 |
| 31 | 桑椹 | kg | 39 | 本品为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长1~2cm，直径0.5~0.8cm。黄棕色、棕红色或暗紫色，有短果序梗。小瘦果卵圆形，稍扁，长约2mm，宽约1mm，外具肉质花被片4枚。气微，味微酸而 | 中国药典2020年版一部 |
| 32 | 水蛭 | kg | 2200 | 本品呈不规则段状、扁块状或扁圆柱状，略鼓起，背部黑褐色，腹面棕黄色至棕褐色，附有少量白色滑石粉。断面松泡，灰白色至焦黄色。气微腥 | 中国药典2020年版一部 |
| 33 | 天竺黄 | kg | 848 | 本品为不规则的片块或颗粒，大小不一。表面灰蓝色、灰黄色或灰白色，有的洁白色，半透明，略带光泽。体轻，质硬而脆，易破碎，吸湿性强。 | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|------|--|--------------|
| 34 | 乌梢蛇 | kg | 1000 | 本品呈半圆筒状或圆槽状的段，长2~4cm，背部黑褐色或灰黑色，腹部黄白色或浅棕色，脊部隆起呈屋脊状，脊部两侧各有2~3条黑线，肋骨排列整齐，肉淡黄色或浅棕色。有的可见尾部。质坚硬，气 | 中国药典2020年版一部 |
| 35 | 西青果 | kg | 62 | 本品呈长卵形，略扁，长1.5~3cm，直径0.5~1.2cm表面黑褐色，具有明显的纵皱纹，一端较大，另一端略小，钝尖，下部有果梗痕。质坚硬。断面褐色，有胶质样光泽，果核不明显，常有空心，小者黑褐色，无空心。气微，味苦涩，微甘。破碎、切碎者呈不规则片或块状。表面黄褐色至黑褐色，具明显纵皱纹。断面黄色、褐色或黑褐色，有胶质样光泽。质坚硬， | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|--------------|
| 36 | 香椽 | kg | 50 | <p>枸椽 本品呈不规则块状或丝条状，厚0.2~0.5cm。外果皮黄色或黄绿色，边缘呈波状，散有凹入的油点；中果皮黄白色或淡棕黄色，有不规则的网状突起的维管束；瓢囊偶见。质柔韧。气清香，味微甜而苦辛。</p> <p>香圆 本品呈不规则块状或丝条状。表面黑绿色或黄棕色，密被凹陷的小油点及网状隆起的粗皱纹，质坚硬。边缘油点明显；瓢囊棕色或淡红棕色，间或有黄白色</p> | 中国药典2020年版一部 |
| 37 | 盐泽泻 | kg | 42 | 泽泻呈圆形或椭圆形厚片。外表皮淡黄色至淡黄棕色，可见细小突起的须根痕。切面黄白色至淡黄色，粉性，有少数细孔。气微，味微苦。盐泽泻形如泽泻片，表面淡黄棕色或黄褐 | 中国药典2020年版一部 |
| 38 | 郁李仁 | kg | 138 | <p>小李仁 呈卵形，长5~8mm，直径3~5mm。表面黄白色或浅棕色，一端尖，另端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深色合点，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。</p> <p>大李仁 长6~10mm，直径5~7mm</p> | 中国药典2020年版一部 |

| | | | | | |
|----------|-----|----|----|---|--------------|
| 39 | 棕榈炭 | kg | 35 | 本品呈不规则块状，大小不一。表面黑褐色至黑色，有光泽，有纵直条纹；触之有黑色炭粉。内部焦黄色，纤维性。略具焦香 | 中国药典2020年版一部 |
| 合计：7754元 | | | | | |

第五包采购清单

| 序号 | 药品名称 | 单位 | 限价/元 | 型号或参数 | 执行标准 |
|----|------|----|------|--|---------------------|
| 1 | 半枝莲 | kg | 40 | 切制 1--1.5cm长段, 过0.3cm 筛, 杂质不 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 2 | 薄荷 | kg | 30 | 叶不少于30%, 味浓, 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 3 | 北败酱草 | kg | 30 | 切制 1--1.5cm 长段, 过 0.3cm筛, 杂质不 | 《甘肃省中药炮制规范》2022年版 |
| 4 | 槟榔 | kg | 53 | 1-2mm薄片, 无杂质, 0.6cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 5 | 草果仁 | kg | 123 | 无杂质, 成熟果实 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 6 | 炒山桃仁 | kg | 88 | 表面黄色至棕黄色, 可见焦斑, 富油性, 气 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 7 | 川贝母 | kg | 7600 | 无杂质 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 8 | 椿皮 | kg | 32 | 无粗皮, 切1--1.5cm 段 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 9 | 醋香附 | kg | 25 | 无毛须及杂质, 微有醋香气, 表面黑褐色 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 10 | 灯心草 | kg | 350 | 杂质不过3% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 11 | 地榆 | kg | 32 | 2--4mm厚片, 0.4cm以上 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 12 | 防风 | kg | 70 | 水分不过10%, 总灰分不过6.5% | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 |
| 13 | 高良姜 | kg | 66 | 本品呈类圆形或不规则形的薄片。外表皮棕红色至暗棕色, 有的可见环节和须根痕。切面灰棕色至红棕色, 外周色较淡, 具多数散在的筋脉小点, 中心圆形, 约占1/3。气香, 味辛辣。 | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|-------------------|
| 14 | 桂枝 | kg | 17 | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。表面红棕色至棕色，有时可见点状皮孔或纵棱线。切面皮部红棕色，木部黄白色或浅黄棕色，髓部类圆形或略呈方形，有特异香气， | 中国药典2020年版 |
| 15 | 荷叶 | kg | 30 | 本品呈不规则的丝状。上表面深绿色或黄绿色，较粗糙；下表面淡灰棕色，较光滑，叶脉明显突起。质脆，易破碎。稍有清香 | 中国药典2020年版 |
| 16 | 化橘红 | kg | 44 | 化州柚 呈对折的七角或展平的五角星状，单片呈柳叶形。完整者展平后直径15~28cm，厚0.2~0.5cm。外表面黄绿色，密布茸毛，有皱纹及小油室；内表面黄白色或淡黄棕色，有脉络纹。质脆，易折断，断面不整齐，外缘有1列不整齐的下凹的油室，内侧稍柔而有弹性。气芳 | 中国药典2020年版 |
| 17 | 焦山楂 | kg | 22 | 本品表面焦褐色，内部黄褐色。有焦香气。 | 中国药典2020年版 |
| 18 | 酒黄芩 | kg | 87 | 本品为类圆形或不规则形薄片。外表皮黄棕色或棕褐色。切面黄棕色或黄绿色，具放射状纹理，略带焦斑，微 | 中国药典2020年版 |
| 19 | 桔核 | kg | 195 | 本品形如橘核。子叶淡棕色或黄绿色，少淡绿色。气微，味微咸、苦。 | 中国药典2020年版 |
| 20 | 枯矾 | kg | 24 | 本品为不透明、白色 | 《中国药典》2015年版一部及四部 |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|--|------------|
| 21 | 刘寄奴 | kg | 51 | 本品呈不规则的段。茎呈圆柱形，有棱，表面棕褐色或黑棕色，被短毛。切面黄白色，中空或有白色髓。花萼长筒状，黄棕色至黑棕色，有明显10条纵棱，先端5裂。蒴果狭卵状椭圆形，较萼稍短，棕 | 中国药典2020年版 |
| 22 | 龙眼肉 | kg | 85 | 本品为纵向破裂的不规则薄片，或呈囊状，长约1.5cm，宽2~4cm，厚约0.1cm。棕黄色至棕褐色，半透明。外表面皱缩不平，内表面光亮而有细纵皱纹。薄片者质柔润，囊状者质稍硬 | 中国药典2020年版 |
| 23 | 路路通 | kg | 22 | 本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径2~3cm。基部有总果梗。表面灰棕色或棕褐色，有多数尖刺和喙状小钝刺，长0.5~1mm，常折断，小蒴果顶部开裂，呈蜂窝状小孔。体轻，质硬，不易破开。气微，味 | 中国药典2020年版 |
| 24 | 马齿苋 | kg | 36 | 本品呈不规则的段。茎圆柱形，表面黄褐色，有明显纵沟纹。叶多破碎，完整者展平后呈倒卵形，先端钝平或微缺，全缘。蒴果圆锥形，内含多数细小种子。气微， | 中国药典2020年版 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|----|----|---|--------------|
| 25 | 女贞子 | kg | 15 | 女贞子呈卵形、椭圆形或肾形，长6~8.5mm，直径3.5~5.5mm。表面黑紫色或灰黑色，皱缩不平，基部有果梗痕或具宿萼及短梗。体轻。外果皮薄，中果皮较松软，易剥离，内果皮木质，黄棕色，具纵棱，破开后种子通常为1粒，肾形，紫黑色，油性。气微，味甘、微苦涩。酒女贞子形如女贞子，表面黑褐色或灰黑色，常附有 | 中国药典2020年版 |
| 26 | 肉桂 | kg | 38 | 本品呈槽状或卷筒状 | 中国药典2020年版一部 |
| 27 | 桑叶 | kg | 23 | 本品为不规则的破碎 | 中国药典2020年版一部 |
| 28 | 乌药 | kg | 47 | 本品呈类圆形的薄片 | 中国药典2020年版一部 |
| 29 | 竹茹 | kg | 25 | 本品为卷曲成团的不 | 中国药典2020年版一部 |
| 30 | 紫苏梗 | kg | 40 | 本品呈类方形的厚片 | 中国药典2020年版一部 |
| 合计：9340元 | | | | | |